

UOC Radiologia e Neuroradiologia Mestre **Premedicazione per Pazienti allergici**

Alla cortese attenzione del MMG del/della Sig./Sig.ra _____

Egregio Dottore, il Suo Assistito riferisce allergia a medicinali, sostanze alimentari o mdc iodato/paramagnetico.

È indicata una premedicazione nei seguenti casi:

- pregressa **reazione allergica o simil-allergica** a seguito di un'indagine con la medesima classe di mdc da impiegare (per es., a base di gadolinio o di iodio);
- presenza di **asma bronchiale** o **orticaria-angioedema** non controllati dalla terapia farmacologica;
- **mastocitosi** ;
- pregressa **anafilassi idiopatica** (ovvero storia di episodio/i di anafilassi in cui non è riconoscibile la causa scatenante).

L'allergia a molluschi, crostacei, pesci o altri alimenti non è da considerarsi un fattore di rischio per reazioni da ipersensibilità al mdc. Anche l'allergia ad altre categorie di farmaci non è da considerare un fattore di rischio per tali reazioni. Un'anamnesi positiva per reazioni da ipersensibilità ad antisettici iodati, quali soluzione di iodopovidone (Betadine) e iodoformio, non costituisce un fattore di rischio per reazioni a MdC a base di iodio.

Se non è possibile effettuare un esame diagnostico alternativo, sebbene esistano scarse evidenze scientifiche sull'efficacia della premedicazione, tuttavia suggeriamo un trattamento farmacologico

preparatorio all'indagine radiologica con somministrazione endovena di mdc, allo scopo di prevenire o quanto meno ridurre eventuali reazioni allergiche.

A tal fine si consiglia il seguente schema di assunzione farmacologica.

Metilprednisolone 32 mg compresse	<ul style="list-style-type: none">✓ Prima assunzione (per os): una compressa 12 ore prima dell'esame✓ Seconda assunzione (per os): una compressa 2 ore prima dell'esame
Cetirizina 10 mg compresse	<ul style="list-style-type: none">✓ Una compressa (per os) 1 ora prima dell'esame
Pantoprazolo 20 mg compresse	<ul style="list-style-type: none">✓ Prima assunzione (per os): una compressa 24 ore prima dell'esame✓ Seconda assunzione (per os): una compressa 12 ore prima dell'esame

Si consiglia inoltre al Paziente un'abbondante idratazione prima e dopo l'esecuzione dell'esame, per favorire l'eliminazione per via renale del mdc, specie in casi di insufficienza renale e/o epatica.

In caso di reazioni allergiche tardive è necessario rivolgersi al proprio Medico Curante.

Si consiglia il seguente trattamento farmacologico, fino a scomparsa dei sintomi:

Metilprednisolone: 1 cp da 16 mg dopo 12 ore dall'esame;

Cetirizina: 1 cp da 10 mg dopo 12 ore dall'esame;

Pantoprazolo: 1 cp da 20 mg dopo 12 ore dall'esame.

Dichiaro di aver assunto la terapia

Data _____

Firma del Paziente _____