

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO CON ANTICOAGULANTI ORALI (TAO)

U.O.C Cardiologia sede di Dolo
Direttore f.f dott. Marco Michieletto

Tel. 0415133330

Cardiologia.dolo@aulss3.veneto.it

Gli anticoagulanti orali (Coumadin – Sintrom) sono farmaci in grado di modificare la capacità di coagulare del sangue, riducendo il rischio di formazione di trombi nei pazienti che per la loro patologia corrono questo pericolo .

Gli anticoagulanti orali provocano un rallentamento della capacità di formazione del coagulo e per valutare l'efficacia del farmaco è necessario fare riferimento ad un esame di laboratorio (Tempo di Protrombina PT e INR) da eseguire 1-2 volte alla settimana per tutta la durata del trattamento fino al raggiungimento di un valore ottimale stabilito in base all'indicazione della Terapia Anticoagulante Orale detta anche TAO.

Generalmente i farmaci anticoagulanti orali sono ben tollerati e non danno rilevanti problemi ad altri organi. Durante il trattamento possono comparire piccole emorragie come la perdita di sangue dalle gengive, dal naso, con le urine o con le feci, ma non devono allarmare. Possono anche formarsi facilmente dei lividi sulla pelle anche per piccoli traumi.

- **Si sconsigliano** trattamenti farmacologici per via intramuscolare per evitare ematomi sulla sede di iniezione.
- **Alcune tipologie di farmaci**, qualora assunti insieme alla Terapia Anticoagulante Orale possono modificarne l'efficacia terapeutica, potenziandola o inibendola. Perciò è importante avvisare sempre il medico curante prima di iniziare/sospendere qualsiasi altro trattamento compresi farmaci da "banco".
- **La Terapia Anticoagulante Orale è indicata** per i pazienti portatori di protesi valvolari cardiache o affetti da malattie valvolari cardiache, trombosi cardiaca endocavitaria, fibrillazione atriale di recente insorgenza, fibrillazione atriale parossistica, cardiomiopia dilatativa, infarto miocardico acuto, tromboembolismo arterioso, trattamento e prevenzione della trombosi venosa profonda e dell'embolia polmonare.
- **La Terapia Anticoagulante Orale è invece controindicata** in caso di gravidanza, malattie psichiatriche, demenza senile grave, alcolismo, malattie gastrointestinali, grave patologia neoplastica, recente emorragia, recente intervento chirurgico, retinopatia, grave ipertensione arteriosa mal controllata, insufficienza renale grave. Inoltre essa è controindicata nel caso in cui il paziente, per varie condizioni, non sia in grado di aderire al programma terapeutico proposto.
- **Modalità di assunzione della Terapia Anticoagulante Orale:** il farmaco deve essere assunto una volta al giorno lontano dai pasti sempre alla stessa ora, seguendo scrupolosamente il dosaggio prescritto sul libretto.

Preso atto di quanto sopra richiamato, confermo che il Dott..... mi ha illustrato la natura del trattamento, la modalità di assunzione della TAO, gli eventuali rischi ad essa connessi, l'eventuale interferenza con altri farmaci, della necessità di informare il medico curante per eventuali problematiche, del diritto di ritirare il consenso in qualsiasi momento senza fornire motivazioni.

Il farmaco, salvo casi particolari, sarà dosato dal proprio medico curante.

Dichiaro di avere ricevuto il **VADEMECUM SULLA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE**.

Certifico di essere maggiorenne. Nel caso non avessi raggiunto la maggiore età, i miei genitori o chi esercita la tutela legale sulla mia persona, firmerà unitamente a me il presente modulo, dopo aver ricevuto le mie stesse informazioni.

Io sottoscritto.....nato il.....

letto quanto sopra, ritenendo di averlo correttamente compreso e ottenuto i chiarimenti richiesti
ACCONSENSO di essere sottoposto a TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (TAO).

Data.....

Firma.....

Sottoscrive il medico che ha raccolto il consenso e fornito le informazioni

Firma.....