

## UOC Radiologia Chioggia

# PREMEDICAZIONE PER PAZIENTI ALLERGICI

Alla cortese attenzione del MMG della/del Sig.ra/Sig. ....

E' indicata una premedicazione nei seguenti casi:

- pregressa reazione allergica o simil-allergica a seguito di un'indagine con la medesima classe di MdC da impiegare (gadolinio o iodio);
- presenza di asma bronchiale o orticaria-angioedema non controllati dalla terapia farmacologica;
- mastocitosi;
- pregressa anafilassi idiopatica (ovvero storia di episodio/i o di anafilassi in cui non è riconoscibile la causa scatenante).

L'allergia a molluschi, crostacei, pesci o altri alimenti non è da considerarsi fattore di rischio per reazioni da ipersensibilità al MdC. Anche l'allergia ad altre categorie di farmaci non è da considerare un fattore di rischio per tali reazioni. Un'anamnesi positiva per reazioni da ipersensibilità ad antisettici iodati, quali soluzione di iodopovidone (Betadine) e iodoformio, non costituisce un fattore di rischio per reazioni a MdC a base di iodio.

Se non è possibile effettuare un esame diagnostico alternativo, sebbene esistano scarse evidenze cliniche sull'efficacia della premedicazione, tuttavia suggeriamo un trattamento farmacologico preparatorio all'indagine radiologica con somministrazione endovena di MdC, allo scopo di ridurre e/o prevenire reazioni allergiche.

A tal fine si consiglia il seguente schema di assunzione farmacologica per os.

24 ore prima dell'esame	<b>Pantoprazolo</b> 1 compressa da 20 mg
12 ore prima dell'esame	<b>Pantoprazolo</b> 1 compressa da 20 mg <b>Metilprednisolone</b> 1 compressa da 32 mg
2 ore prima dell'esame	<b>Metilprednisolone</b> 1 compressa da 32 mg
1 ora prima dell'esame	<b>Cetirizina</b> 1 compressa da 10 mg

Si consiglia al Paziente un'abbondante idratazione prima e dopo l'esecuzione dell'esame, per favorire l'eliminazione per via renale del MdC, soprattutto nei casi di insufficienza renale e/o epatica.

In caso di reazioni allergiche tardive è necessario rivolgersi al proprio Medico Curante. Si consiglia il seguente trattamento farmacologico, fino a scomparsa dei sintomi:

**Metilprednisolone:** 1 cp da 16 mg dopo 12 ore dall'esame;

**Cetirizina:** 1 cp da 10 mg dopo 12 ore dall'esame;

**Pantoprazolo:** 1 cp da 20 mg dopo 12 ore dall'esame.

### Dichiaro di aver assunto la terapia

Data \_\_\_\_\_

Firma del Paziente \_\_\_\_\_