

INFORMATIVA PER RICERCA MUCOSA GASTRICA ECTOPICA IN DIVERTICOLO DI MECKEL

Codici CVP 2.4 prestazione da inserire nell'impegnativa : 92.04.7 (92.04.7_0)	RICERCA DI MUCOSA GASTRICA ECTOPICA
---	--

Introduzione : Tale indagine permette la ricerca di mucosa gastrica ectopica dell'intestino, in particolare a livello di residui di estroflessioni embrionali rappresentati dal Diverticolo di Meckel. Tale mucosa posta in sede anomala può essere responsabile di sanguinamento gastro-intestinale. Tale esame sfrutta la capacità di un farmaco radioattivo (Tc99m-Pertecnato) di fissarsi anche alla mucosa gastrica ectopica (diversa dalla sede gastrica) identificandola.

Prima di iniziare l'esame, il Medico Nucleare valuterà a tutela del paziente la congruità e l'appropriatezza dell'esame in base ai dati clinici ed il quesito proposto, per cui è necessario portare tutta la documentazione specifica il giorno di esecuzione dell'esame (DGL n°101/2020).

Indicazioni :

Conferma del sospetto clinico-strumentale di presenza di mucosa gastrica ectopica in paziente con enterorragia.

Controindicazioni :

Gravidanza, che deve essere esclusa in donne in età fertile ; se non vi è certezza l'esame dovrà essere eseguito solo dopo aver eseguito un test di gravidanza.

Nel caso una donna stia allattando, dovrà essere sospeso l'allattamento per 48 ore e il latte rimosso dovrà essere eliminato.

Documentazione da portare il giorno dell'esame :

- Visite mediche inerenti (da specialista gastroenterologo e internista o pediatra) e/o lettere di dimissioni
- Indagini radiologiche e/o endoscopiche eseguite (Ecografia addome, ect.)
- Esami ematochimici

Preparazione :

E' necessario il digiuno dalla mezzanotte precedente per eseguire l'esame.

E' necessario eseguire prima dell'esame apposita premedicazione con farmaci inibitori di pompa gastrica (Adulto : **Omeprazolo** 20 mg x 2 /die nei due giorni precedenti all'esame ; Bambino : consultare il pediatra che prescriverà il dosaggio adeguato in base all'età) .

Non devono essere eseguiti esami con mezzo di contrasto baritato per os nella settimana precedente all'esame

Modalità esecuzione :

Per l'esecuzione dell'esame verrà disteso supino sul lettino di apposita apparecchiatura (Gamma Camera) che le verrà posizionata sopra la regione addominale; in tale posizione le verrà somministrato

per via endovenosa un farmaco radioattivo (Tc99m-Per tecnetato) e subito inizierà la registrazione di immagini della durata di circa 60 minuti.

Durante la registrazione di tali immagini è molto importante mantenere l'immobilità, perciò qualora abbia difficoltà a rimanere fermo o soffra di claustrofobia è necessario che avverta prontamente il personale della Medicina Nucleare.

TEMPO TOTALE DI PERMANENZA IN MEDICINA NUCLEARE : CIRCA 2-3 ORE.

Dopo l'esame potrà tornare alle sue attività abituali, dovrà bere abbondantemente e rimanere lontano da bambini piccoli e donne in gravidanza (almeno 2 metri) per circa 24 ore, periodo in cui la radioattività viene eliminata. I bambini che eseguono l'esame devono rimanere lontani da eventuali fratelli piccoli ; eventuali pannolini utilizzati il giorno dell'esame dovranno essere smaltiti normalmente il giorno successivo all'esecuzione dell'esame.

Esami alternativi :

Non esistono esami diagnostici alternativi. Tale indagine viene comunque in genere eseguita dopo l'esecuzione di una colonscopia o gastroscopia.

Rischi :

La dose di radiazioni assorbita dal paziente risulta modesta e non comporta rischi immediati né rischi a lungo termine.

La probabilità di reazione allergica è rara, in caso di disturbi dopo la somministrazione del radiofarmaco, lo comunichi al personale tempestivamente.

Dopo l'esame il paziente potrà tornare alle sue abituali attività, dovrà bere abbondantemente rimanendo lontano da bambini piccoli e donne in gravidanza (almeno 2 metri) per circa 24 ore, periodo in cui la radioattività viene eliminata.

SI CONSIGLIA IL GIORNO DELL'ESAME DI NON INDOSSARE MONILI O OGGETTI METALLICI CHE DOVRANNO ESSERE TOLTI PRIMA DELL'ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI. L'AZIENDA ULSS NON RISPONDERA' IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO

NEL CASO DI DISDETTA CONTATTARE DIRETTAMENTE LA UOC MEDICINA NUCLEARE entro le 12,00 del 4° giorno lavorativo prima dell' appuntamento, dalle ore 8:00 alle ore 15:00 o inviando mail ai seguenti indirizzi:

ocme.pet@aulss3.veneto.it - ocme.mednucseg@aulss3.veneto.it

pena l'addebito della tariffa prevista dal vigente Nomenclatore tariffario, anche se esente dalla partecipazione alla spesa sanitaria.